

牛的人道屠宰



穿透性弹击致昏位置
(正视图)

穿透性弹击致昏位置
(侧视图)

屠宰位置 (侧视图)

正确的力度

: 在维护良好的装置中, 使用3到4格令弹药筒

正确的位置

: 无角和有角动物位置相同

正确的屠宰

: 使用胸部屠宰法, 在60秒内屠宰

有效致昏的迹象

- 动物瘫倒
- 不再规律呼吸
- 眼神呆滞注视
- 无角膜反射
- 颌骨放松
- 舌头伸出

如不确定, 则应使用工作正常的后备致昏装置再次对动物进行致昏

- 如果第一次致昏没有插入正确位置, 则应进行第二次致昏, 确保尽量靠近正确位置
- 如果第一次致昏射入位置正确, 但没形成有效致昏, 则第二次致昏位置应在第一次位置上方的2厘米高度、左侧或右侧2厘米处

如需了解更多信息, 请联系 :

人道屠宰协会

The Old School, Brewhouse Hill, Wheathampstead, Herts AL4 8AN UK

电话: +44(0) 1582 831919 网址: www.hsa.org.uk 电子邮件: info@hsa.org.uk

© HSA 2018 文本修改 2008

慈善机构, 注册地: 英格兰和威尔士, 注册号: 1159690慈善组织